

膵・胆道癌 (PB PC BT)

コード	治療名	一般名	製剤名	投与量	投与日	投与時間	1コース	備考
PB001	GEM	ゲムシタビン		1000mg/m <sup>2</sup>	d1.8.15	30分	4週	
PB002	S-1 + GEM(d1.8)	ゲムシタビン		1000mg/m <sup>2</sup>	d1.8	30分	3週	S-1:C、F法
		S-1		60・80mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-14			
PB003	S-1 + GEM(d8.15)	ゲムシタビン		1000mg/m <sup>2</sup>	d8.15	30分	3週	
		S-1		60mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-14			
PB004	biweeklyGEM	ゲムシタビン		1000mg/m <sup>2</sup>	d1	30分	2週	
PB005	S-1 + biweeklyGEM	ゲムシタビン		1000mg/m <sup>2</sup>	d1.15	30分	4週	
		S-1		80mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-14			
BT001	GC	ゲムシタビン		1000mg/m <sup>2</sup>	d1.8	30分	3週	胆道癌
		シスプラチン		25mg/m <sup>2</sup>	d1.8	60分		
PC001	nab-PTX+GEM	nab-パクリタキセル	アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>	d1.8.15	30分	4週	膵癌
		ゲムシタビン		1000mg/m <sup>2</sup>	d1.8.15	30分		
PC002 (01-02)	FOLFIRINOX	オキサリプラチン		85mg/m <sup>2</sup>	d1	120分	2週	膵癌
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		イリノテカン		180mg/m <sup>2</sup>	d1	90分		
		フルオロウラシル		400mg/m <sup>2</sup>	d1	全開		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
PC003 (01-02)	mFOLFIRINOX	オキサリプラチン		85mg/m <sup>2</sup>	d1	120分	2週	膵癌
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		イリノテカン		150mg/m <sup>2</sup>	d1	90分		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
PC004 (01-04)	nal-IRI+5-FU/l-LV	lipo-イリノテカン	オニバイド	70・50mg/m <sup>2</sup>	d1	90分	2週	膵癌
		レボホリナート		200mg/m <sup>2</sup>	d1	120分		
		フルオロウラシル		2400mg/m <sup>2</sup>	d1-2	46時間		
BT002 (01-02)	Durvalumab + GC	デュバルマブ	イミフィンジ	1500mg/body (BW≤30kg:20mg/kg)	d1	60分	3週	胆道癌
		ゲムシタビン		1000mg/m <sup>2</sup>	d1.8	30分		
		シスプラチン		25mg/m <sup>2</sup>	d1.8	60分		
BT003 (01-02)	Durvalumab(メンテ)	デュバルマブ	イミフィンジ	1500mg/body (BW≤30kg:20mg/kg)	d1	60分	4週	胆道癌
BT004	GCS	ゲムシタビン		1000mg/m <sup>2</sup>	d1	30分	2週	胆道癌 S-1:E法
		シスプラチン		25mg/m <sup>2</sup>	d1	60分		
		S-1		80mg/m <sup>2</sup> /d 分2	d1-7			