

有害事象 Grade 表 (CTCAE v5.0 参照)

Grade	有害事象の重症度
1	軽症 症状がないまたは軽度の症状がある、臨床所見または検査所見のみ、治療を要さない
2	中等症 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する 年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限*
3	重症 または医学的に重大であるが直ちに生命を脅かすものではない 入院または入院期間の延長を要する、機能障害、身の回りの日常生活動作の制限**
4	生命を脅かす 緊急処置を要する
5	有害事象による死亡

*身の回り以外の日常生活動作とは、食事の準備、日用品や衣服の買い物、電話の使用、金銭の管理などをさす

**身の回りの日常生活動作とは、入浴、着衣・脱衣、食事の摂取、トイレの使用、薬の内服が可能で、寝たきりではない状態をさす

有害事象	Grade1	Grade2	Grade3
食欲低下	食欲が落ちたが量は半分以上食べられる	食欲がおちて、量は半分以下になった	食べられず体重が減った
悪心	軽い吐き気があり、食欲が落ちた	吐き気で食べる量が減り、体重が減った	経腸栄養剤を摂取したり、点滴をした
嘔吐	嘔吐があったがすぐ治まった	嘔吐が続く病院を受診した	嘔吐があり、入院した
味覚障害	味が少し変わったが今まで通り食べられた	味が変わって食べる量が減った / 食べ物の嗜好が変わった	
口腔粘膜炎	しみるが食べられる	痛みで食べ物を変更・工夫した、治療用の含嗽薬や口腔軟膏を使用した	痛みでほとんど食べられなかった
手足症候群	手足が赤くなったが痛みはない	手足が赤くなり痛みもあった	手足に痛みがあり身の回りのことができない(入浴、着脱衣、排泄、食事など)
皮疹	部分的に皮疹が出来た	体の 10-30%程度に皮疹ができた/ 見た目が気になり、外出や家族以外の面会を控えている	体表面積の >30%以上に症状があり、入浴・睡眠など生活に制限がある
爪囲炎	赤くなったが痛みはなし	痛みや滲出液を伴う	症状により歩行や手先の作業に支障がある
下痢	便回数が以前より 1~3 回/日増えた	便回数が以前より 4~6 回/日増えた	便回数が以前より 1 日 7 回以上増えた
便秘	便秘して薬剤や浣腸を何回か使用した	便秘して薬剤や浣腸を毎回使用した	
末梢神経障害	指先や足裏に違和感があったが今は何ともない	身の回り以外の動作に影響がある(買い物、食事の準備、電話の使用、金銭の管理など)	身の回りの動作への影響がある(入浴、ボタンかけ、排泄、箸の使用など)